

内服抗がん剤服用患者の 薬薬連携に向けた取り組みについて

～電話服薬支援による「服薬後の体調変化」の確認と情報共有の試み～

平成30年8月25日

浅井薬局 橋店

山洞 直樹

COI 開示

発表者名： 山洞 直樹

演題発表内容に関連し、発表者に開示すべき
COI関係にある企業などはありません。


内服抗がん剤服用患者の概要

- 50代 女性
- 腹膜播種（原発：大腸がん）
- カペシタビンを含むレジメンにて治療経験あり
- カペシタビン使用にて顔に皮膚障害発現経験あり
- パニツムマブ点滴治療経験あり
- **トリフルリジン・チピラシル配合錠による治療を開始**
- 尿管狭窄にて尿管ステント留置、定期的に交換
- 併用薬：パントシン、酸化マグネシウム、センノシド


トリフルリジン・チピラシルについて

- 治癒切除不能な進行再発の結腸・直腸癌に対する三～四次治療薬。

【服用スケジュール】



トリフルリジン・チピラシルについて



症例の経過と薬局来局時の対応

	症例の経過	薬局来局時の対応
1クールday1	初回投与時	投与量の確認・服用日の確認・感染注意
1クールday15	1クールで嘔吐あり 吐き気止め処方	服薬状況の確認・吐き気止めの服用のタイミングについて説明
1	<div style="border: 2px solid red; background-color: yellow; padding: 10px;"> <p>【2クール目延期になったときの患者コメント】 「これがダメなら使う薬がなくなってしまうよね。」</p> </div>	
2クールday1 (開始後43日目)	2週間延期後、80%量で再開	吐き気止めの残薬確認
2クールday15 (開始後57日目)	80%量でも嘔吐あり	吐き気止めの服用タイミングについて説明
2クール (開始後71日目)	<div style="border: 2px solid red; background-color: yellow; padding: 10px;"> <p>【3クール目延期になったときの患者コメント】 「吐き気があるので、休薬になって安心しました」</p> </div>	
3クールday1 (開始後85日目)	2週間延期後、60%量で再開	吐き気止めの残薬確認 電話服薬支援開始








「電話しよう！！」

患者さんの健康サポート



日常生活に寄り添うことで、
気軽に相談できる薬局に。

電話服薬支援同意説明書

電話服薬支援について下記の説明を受け、同意をいたします。

20 年 月 日

20 年 月 日

(連絡先電話番号)

(患者署名)

電話をかけ、あらかじめお渡しするチェックリストをもとに、服薬後の体調変化についてお尋ねし、指導助言を行います。
また、電話にて薬局が得た情報(服薬後の体調変化、薬局より指導、助言した内容)を、医療機関へ文書にて連絡し、情報共有します。
※薬局業務の状況によっては、お電話する日時が前後する場合がございます。ご了承ください。

□3. 電話服薬支援の期間

対象とする薬の使用期間中。

□4. 電話服薬支援の利用および中止の自由

電話服薬支援の利用は自由です。また、利用することに同意された後でも、利用をやめることは自由です。利用を中止される場合、患者さんが不利益を受けることはありません。

□5. 電話服薬支援の利用に関する費用の負担について




次回処方箋調剤時に下記の費用がかかります。

服薬情報提供料2(20点)(月に1回まで)

※自己
自己


□6. プライバシー

利用された方
このサービスで
ありますが、こ




電話服薬支援

通院



服薬状況の報告
副作用評価の共有



服薬状況の確認
副作用発現状況の確認
生活指導



電話服薬支援患者への指導内容

5日間飲み忘れなく服用できましたか？



はい。忘れずに飲めました。ただ、食後すぐに飲むのがつらくて、2～3時間経ってから飲むことが多かったです。

そうだったんですね。この薬は空腹時に服用すると、食後投与と比較してCmaxの上昇が認められます。副作用が起きやすくなる可能性があるため、可能な範囲でいいので、食後に服用するようにお願いします。



そうなんですか。やってみますね。



電話服薬支援患者への指導内容

次に、吐き気、下痢などの体調変化で気になる症状はありましたか？



はい。5日間飲んだあと嘔吐が1回だけありました。

嘔吐の程度は？回数は1回だけですね。吐き気止めは飲みましたか？




一度嘔吐したら吐き気は収まりました。吐き気止めは高価なものと聞いているので飲みませんでした。

そうなんですね。次回吐き気止めをためらわずに服用してください。また、嘔吐が続くようなことがあったら、脱水症状も心配なので、水分補給を意識するようにお願いします。




電話服薬支援

通院



服薬状況の報告
副作用評価の共有



服薬状況の確認
副作用発現状況の確認
生活指導



服薬情報等提供書

情報提供先医療機関名

担当医 ●● ●● 殿

平成30年 ※月 ※※日

浅井薬局 橋店

津島市橋町6丁目24番地1

電話 0567-27-5121

FAX 0567-27-5122

保険薬剤師氏名 山洞 直樹

患者氏名 ■■ ■■ (ID: △△△△)

性別 (女) 生年月日 昭和××年××月××日生 (50代)

住所

電話番号

処方せん発行日 平成30年※月※※日 電話支援日 平成30年※月※※日

処方薬剤の服薬状況 (コンプライアンス) に関する情報

ロンサーフ配合錠を※/※※の夕から服薬再開して、※/※※の朝まで5日間忘れずに服用できていました。先週は「食後すぐ飲めないことが多い」との事でしたが、今回は食後すぐの服用ができていました。

患者の訴え (アレルギー、副作用と思われる症状等) に関する情報

前回、電話頂いた次の日と、昨日両方とも火曜日の午前中に嘔吐しました。直前に気持ち悪くなって1回だけ嘔吐すると吐気はおさまりました。そのあとは吐気が起こることもなく、昼食からは通常どおり食べられました。吐気止め (ナゼア錠) は高価な薬だと聞いて使うのをためらってしまいます。まだ手持ち残っています。そのほか、下痢、風邪などなく過ごしています。

ロンサーフ配合錠服用時の副作用に関する情報 (CTCAEによるグレード分類)

悪心: グレード1

嘔吐: グレード1

下痢: なし

食欲不振: グレード1

服薬指導に関する情報

前回指導したように食後すぐの服用をして頂けていました。しかし、ロンサーフを5日間服用の翌日に嘔吐がありました。「吐気止めを高価という理由で服用をためらっている」という点について、吐気が出た場合はためらわず使用するよう指導しました。次回、ロンサーフ配合錠は休業期間ではありますが、次回は※月※※日※※時に電話による服薬指導を行う予定です。

服薬状況に関する情報

患者の訴えに関する情報

副作用の評価に関する情報

電話による服薬指導に関する情報

服薬情報等提供書

情報提供先医療機関名

担当医 ●● ●● 殿

平成30年 ※月 ※※日

浅井薬局 橋店

津島市橋町6丁目24番地1

電話 0567-27-5121

FAX 0567-27-5122

保険薬剤師氏名 山洞 直樹

患者氏名 ■■ ■■ (ID: △△△△)

性別 (女) 生年月日 昭和××年××月××日生 (50代)

住所

電話番号

処方せん発行日 平成30年※月※※日

電話支援日 平成30年※月※※日

処方薬剤の服薬状況 (コンプライアンス) に関する情報

ロンサーフ配合錠を※/※※の夕から服薬再開して、※/※※の朝まで5日間忘れずに

ロンサーフ配合錠服用時の副作用に関する情報 (CTCAEによるグレード分類)

悪心：グレード1

嘔吐：グレード1


下痢：なし

食欲不振：グレード1

服薬指導に関する情報

前回指導したように食後すぐの服用をして頂けていました。しかし、ロンサーフを5日間服用の翌日に嘔吐がありました。「吐気止めを高価という理由で服用をためらっている」という点について、吐気が出た場合はためらわず使用するように指導しました。次回、ロンサーフ配合錠は休業期間ではありますが、次回は※月※※日※※時に電話による服薬指導を行う予定です。

相互の情報連絡が患者のために



患者さんにより寄り添うことができるのではないかと